

LE PREMIER ET SEUL ANTAGONISTE NON HORMONAL DE LA NEUROKININE B (NKB) INDIQUÉ POUR LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES VASOMOTEURS ASSOCIÉS À LA MÉNOPAUSE^{1-3*}.



DÉCOUVREZ VEOZAH

POUR LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES VASOMOTEURS MODÉRÉS À SÉVÈRES, COMMUNÉMENT APPELÉS BOUFFÉES DE CHALEUR ET SUEURS NOCTURNES⁴.

VEOZAH (comprimés pelliculés de fezolinetant) est indiqué pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères associés à la ménopause.

Les neurones KNDy de l'hypothalamus sont inhibés par les estrogènes et stimulés par le neuropeptide NKB^{2,4}. La physiopathologie des symptômes vasomoteurs n'est pas entièrement comprise⁴. RÉCEPTEUR DE LA NKB RÉCEPTEUR DE LA NKB

Explorez le mode d'action de VEOZAH.



 $KNDy: kis speptine/neurokinine \ B/dynorphine; \ NKB: neurokinine \ B; \ NK3: neurokinine \ 3.$

- * La portée clinique comparative est inconnue.
- † La portée clinique est inconnue.



LE PREMIER ET SEUL ANTAGONISTE NON HORMONAL DES RÉCEPTEURS DE LA NEUROKININE B (NKB) INDIQUÉ POUR LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES VASOMOTEURS ASSOCIÉS À LA MÉNOPAUSE^{1-3*}.



VEOZAH est un antagoniste sélectif non hormonal des récepteurs de la neurokinine 3 (NK3).

Bloque
LA LIAISON DE
LA NKB
sur les
NEURONES KNDy

modulant
L'ACTIVITÉ
NEURONALE DANS
LE CENTRE DE
THERMORÉGULATION
DE L'HYPOTHALAMUS*



Balayez le code pour explorer le mode d'action de VEOZAH.

Consultez la monographie à la page veozahmonographie.ca pour obtenir des renseignements importants sur :

- VEOZAH est contre-indiqué chez les patientes qui sont atteintes de cirrhose connue ou d'insuffisance rénale sévère ou terminale, qui utilisent de façon concomitante des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP1A2, dont la grossesse est connue ou suspectée ou qui sont hypersensibles à ce médicament ou à tout ingrédient de la formulation.
- Mises en garde et précautions pertinentes concernant l'incidence d'autres tumeurs malignes, du cancer du sein connu ou antérieur ou des tumeurs malignes dépendantes des œstrogènes, l'hyperplasie endométriale et le carcinome endométrial, les patientes présentant une insuffisance hépatique modérée ou sévère (classe B ou C de Child Pugh), l'élévation des transaminases hépatiques et une hépatotoxicité, la fonction hépatique et la surveillance des blessures, ainsi que l'allaitement.
- Les conditions d'utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie.

Vous pouvez également obtenir la monographie du produit en appelant le 1-888-338-1824.

KNDy: kisspeptine/neurokinine B/dynorphine; NK3: neurokinine 3; NKB: neurokinine B

* La portée clinique comparative est inconnue

[†]La portée clinique est inconnue.

RÉFÉRENCES: 1. Monographie de produit de Veozah. Markham (ON): Astellas Pharma Canada, Inc. 2. The North American Menopause Society (NAMS). Menopause. 2023;30(6):573-590. 3. Données internes. Astellas Pharma Canada, Inc. 4. Yuksel N, Evaniuk D, Huang L, et al. Directive clinique no 422a: Ménopause: symptômes vasomoteurs, agents thérapeutiques d'ordonnance, médecines douces et complémentaires, nutrition et mode de vie. J Obstet Gynaecol Can. Oct. 2021;43(10):1188-1204.e1





