



**LE PREMIER ANTAGONISTE NON HORMONAL
DE LA NEUROKININE B (NK1) INDICUÉ POUR LE
TRAITEMENT DES SYMPTÔMES VASOMOTEURS
ASSOCIÉS À LA MÉNOPAUSE^{1-3*}**

ENVISAGEZ VEOZAH

UNE DOSE, UN COMPRIMÉ, UNE FOIS PAR JOUR

45 mg par voie orale une fois par jour, avec ou sans nourriture

**VEOZAH (comprimés de fezolinetant pelliculés) est indiqué
pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à
sévéres associés à la ménopause¹.**



Taille réelle. Comprimé
d'un diamètre de 7 mm.

Dose recommandée et administration¹



45 mg par voie orale une fois par jour, avec ou sans nourriture

VEOZAH doit être administré à environ la même heure chaque jour, avec des liquides et avalé en entier. Ne pas couper, écraser, ni croquer les comprimés. Les comprimés de VEOZAH ne contiennent ni gluten ni lactose[†].



Dose oubliée

Si une dose est oubliée ou n'est pas prise à l'heure habituelle, la patiente doit alors prendre la dose oubliée le plus tôt possible, sauf s'il reste moins de 12 heures avant la prochaine dose prévue. Suivre le calendrier posologique habituel le lendemain.



Populations particulières

Insuffisance hépatique

- VEOZAH est contre-indiqué chez les personnes atteintes de cirrhose.
- VEOZAH n'est pas recommandé chez les personnes présentant une insuffisance hépatique chronique de classe B de Child-Pugh (modérée).
- VEOZAH n'a pas été étudié chez les personnes présentant une insuffisance hépatique chronique de classe C de Child-Pugh (sévère) et n'est pas recommandé dans cette population.

Insuffisance rénale

- VEOZAH est contre-indiqué chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale sévère[‡].
- VEOZAH n'a pas été étudié chez les personnes présentant une insuffisance rénale terminale et est contre-indiqué dans cette population[§].

Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir des instructions complètes sur la posologie et l'administration.

* La portée clinique comparative est inconnue.

† La portée clinique est inconnue.


‡ TFGe inférieur à 30 mL/min/1,73 m².

§ TFGe inférieur à 15 mL/min/1,73 m².

TFGe : débit de filtration glomérulaire estimé.

CONSIDÉRATIONS POSOLOGIQUES¹

Surveillance de la fonction hépatique



Quand effectuer la surveillance

- Fonction hépatique initiale (avant le traitement par VEOZAH)
- Tous les mois pendant les 3 premiers mois, à 6 mois et à 9 mois



Ce qu'il faut surveiller

Effectuer des analyses sanguines pour évaluer la fonction hépatique et rechercher la présence de lésions :

- Taux sérique d'ALT
- Taux sérique d'AST
- Taux sérique de PA
- Taux sérique de bilirubine (totale et directe)

Directives cliniques

Procéder avec prudence si : • le taux d'ALT ou d'AST se situe entre 1,5 et 2 fois la LSN.

Ne pas commencer le traitement par VEOZAH si : • le taux d'ALT ou d'AST est supérieur ou égal à deux fois la LSN; **ou** • le taux de bilirubine totale est supérieur ou égal à deux fois la LSN.

Interrompre l'administration de VEOZAH si : • les élévations des taux de transaminases sont supérieures à cinq fois la LSN; **et/ou** • les élévations des taux de transaminases sont supérieures à trois fois la LSN et le taux de bilirubine totale est supérieur à deux fois la LSN.

Si des élévations des taux de transaminases supérieures ou égales à trois fois la LSN sont observées : • effectuer des analyses de laboratoire de suivi de la fonction hépatique plus fréquentes jusqu'à la résolution; • exclure les autres causes d'élévations des résultats des analyses de laboratoire de la fonction hépatique.

Conseiller aux patientes d'arrêter immédiatement VEOZAH et de consulter un médecin pour demander des analyses hépatiques en laboratoire, si elles présentent les signes ou les symptômes énumérés ci-dessous pouvant suggérer une lésion hépatique.

- Fatigue nouvelle, diminution de l'appétit, nausées, vomissements, prurit, jaunisse, pâleur des selles, urines foncées ou douleurs abdominales.

Pour une utilisation appropriée de VEOZAH, veillez à ce que toutes les exigences en matière de tolérance hépatique soient respectées.

Consultez la monographie de produit à l'adresse veozahmonographie.ca pour obtenir des renseignements importants sur :

- Les contre-indications chez les personnes qui présentent une cirrhose connue ou sont atteintes d'insuffisance rénale sévère ou terminale, qui utilisent de façon concomitante des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP1A2, dont la grossesse est avérée ou présumée ou qui présentent une hypersensibilité à ce médicament ou à tout ingrédient de la formulation;
- Les mises en garde et précautions pertinentes concernant l'incidence de tumeurs malignes, du cancer du sein connu ou antérieur ou d'autres tumeurs malignes dépendantes des œstrogènes, de l'hyperplasie endométriale et du carcinome endométrial, de l'insuffisance hépatique modérée ou sévère (classe B ou C de Child-Pugh), de l'élévation des transaminases hépatiques et de l'hépatotoxicité, de la surveillance de la fonction hépatique et des lésions, ainsi que de l'allaitement;

- Les conditions d'utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie.

Vous pouvez également obtenir la monographie de produit en appelant le **1-888-338-1824**.

Numérisez le code QR ou visitez le site **Veozahps.ca** pour accéder à des ressources supplémentaires.



PA : phosphatase alcaline; ALT : alanine aminotransférase; AST : aspartate aminotransférase; LSN : limite supérieure de la normale.

RÉFÉRENCES : **1.** Monographie de produit de VEOZAH. Markham (ON) : Astellas Pharma Canada, Inc. **2.** The North American Menopause Society (NAMS). *Menopause*. 2023;30(6):573-590. **3.** Données internes. Première et unique réclamation. **4.** Données internes. À déterminer.

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 Astellas Pharma Inc. ou ses sociétés affiliées.

MAT-CA-VEO-2026-00062 03/26