

Comprendre les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes

LE SAVIEZ-VOUS?

Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes que vous ressentez sont appelées symptômes vasomoteurs et constituent les symptômes de la ménopause les plus signalés.

- Jusqu'à 80 % des femmes sont touchées par les symptômes vasomoteurs
- Environ 20 % des femmes présentent des symptômes sévères et dérangeants, à hauteur de 20 ou 30 épisodes par jour

Gérer votre parcours avec VEOZAH

Pour quoi VEOZAH est-il utilisé?

VEOZAH est utilisé chez les femmes adultes atteignant la ménopause pour traiter les symptômes vasomoteurs modérés à sévères associés à la ménopause, communément appelés bouffées de chaleur et sueurs nocturnes.

Quel est le mécanisme d'action de VEOZAH?



Avant la ménopause

Il existe un équilibre entre les œstrogènes (une hormone sexuelle féminine) et la neurokinine B (NKB, une substance chimique présente dans le cerveau). Cet équilibre permet de contrôler la température du corps.



À la ménopause

Le corps produit moins d'œstrogènes, mais la quantité de NKB reste inchangée. L'équilibre est rompu, ce qui provoque l'apparition de bouffées de chaleur et de sueurs nocturnes.

VEOZAH bloque la NKB et aide à rétablir cet équilibre dans le corps, ce qui réduit le nombre et l'intensité des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes.

Comment prendre VEOZAH?

Respectez scrupuleusement les instructions de votre professionnel de la santé. En cas de doute, consultez votre professionnel de la santé.



VEOZAH est un comprimé de 45 mg à prendre une fois par jour à environ la même heure, avec ou sans nourriture.



Vous devez avaler le comprimé en entier avec des liquides. Veuillez ne pas couper, écraser ou croquer le comprimé.



Renseignements importants sur VEOZAH

Avant de commencer à prendre VEOZAH, parlez-en à votre médecin si vous :

- avez été atteinte ou êtes atteinte d'un cancer;
- êtes atteinte d'une maladie du foie ou avez des problèmes hépatiques;
- présentez des troubles des reins;
- êtes âgée de 65 ans ou plus.

Ne prenez pas VEOZAH si vous :

- êtes allergique au fezolinetant ou à l'un des autres ingrédients contenus dans VEOZAH ou dans son emballage;
- êtes atteinte de cirrhose (cicatrisation sévère du foie);
- présentez de sévères troubles des reins, dont une insuffisance rénale;
- prenez certains médicaments appelés inhibiteurs du CYP1A2, tels que la fluvoxamine;
- êtes enceinte ou pensez être enceinte;
- vous allaitez.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à VEOZAH?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez VEOZAH. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre médecin.

Les effets secondaires peuvent inclure : diarrhée, nausées ou vomissements, maux de tête, fièvre, étourdissements, douleurs à l'estomac, fatigue, difficulté à dormir, bouffées de chaleur, anxiété, acné et symptômes de rhume/grippe.

Hépatotoxicité (lésions hépatiques) :

Le traitement par VEOZAH peut entraîner des problèmes hépatiques, comme l'hépatotoxicité (lésions hépatiques). Des analyses sanguines seront effectuées avant le traitement, tous les mois pendant les 3 premiers mois, à 6 mois et à 9 mois après le début du traitement. Si les valeurs de votre bilan sanguin hépatique sont élevées, votre professionnel de la santé pourra arrêter le traitement.

Cessez d'utiliser VEOZAH et obtenez immédiatement des soins médicaux si vous ressentez l'un des symptômes suivants : jaunisse (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux), urine foncée, selles claires, perte d'appétit pendant plusieurs jours ou plus longtemps, nausées, vomissements, douleurs d'estomac, sensation de fatigue plus importante que d'habitude et démangeaisons cutanées.

Veuillez consulter les renseignements sur le médicament pour le patient pour obtenir l'ensemble des instructions sur la posologie et des informations sur l'innocuité.